

Co-trimoxazole (SMX-TMP)
Nombre de Marca: Septra, Bactrim y Sulfatrim

Razones para tomar la medicina:

Bactrim es un antibiótico usado para tratar diferentes tipos de infecciones incluyendo: urinarias, del oído y respiratorias.

No se recomienda el uso de esta medicina en niños menores de 2 años.

Dosis, horario y almacenamiento:

Tome cada dosis con líquidos. Si su estómago no resiste la medicina, entonces deberá de tomarla con comidas o leche. Debe de agitar el frasco antes de tomar cada dosis de la forma líquida de esta medicina. Si su niño(a) está tomando esta medicina para prevenir una infección urinaria, la dosis debe ser administrada antes de ir a dormir.

Para bebés y niños(as) la dosis se determinará de acuerdo al peso y se debe de ajustar a medida del crecimiento del niño(a).

Se debe de almacenar a temperatura ambiente (no necesita refrigeración), fuera de la luz del sol y en un lugar sin humedad. Mantenga la medicina fuera del alcance de los niños.

Si se olvidó de tomar una dosis:

Tome la dosis tan pronto se de cuenta del olvido a menos que sea casi la hora de tomar la siguiente dosis. **No tome doble dosis.** Después continúe con el horario normal.

Efectos secundarios más comunes:

Si su niño presenta: salpullido, hinchazón, picazón, problemas respiratorios informe inmediatamente a su doctor y pare de darle la medicina.

Esta medicina puede provocar problemas estomacales, diarrea, náusea, dolor de cabeza o vómito. Llame a nuestra oficina si cualquiera de estos efectos persiste o si se intensifica. Este medicamento contiene sulfa, la cual incrementa su sensibilidad a la luz del sol, por favor use ropa que lo cubra y crema protectora del sol.

En caso de sobredosis llame al Centro de Control de Envenamiento (Poison Control Center): 1-800-876-4766

Urología Pediátrica - Folleto de Educación al Paciente
Septra

Eric A. Kurzrock, MD, FAAP
Paula Wagner, RN, FNP